



**BODENSEE-  
HOCHRHEIN-  
PRIVATKLINIK-GMBH**

## Operationen an den Weichteilen des Gesichts

### Lidchirurgie - Unterlider

Die Straffung der Unterlider erfolgt mit der subziliaren Inzision - Schnitt etwa 3 - 4 mm unterhalb der Lidkante.

**Wichtig!** Zwischen Ober- und Untelidinzision soll eine ausreichende Hautbrücke - ca. 1cm - (siehe Bild) belassen werden, um den Lymphabfluss zu gewährleisten.

Bei jüngeren Patienten wird lediglich ein Hautlappen präpariert und eventuell vorquellendes Fett entfernt. Besteht eine Wulstbildung am Unterlid - oft bei älteren Patienten - so ist es notwendig einen Muskelstreifen zu entfernen und eine seitliche Straffung Muskelaufhängeplastik mit Kanthopexie (Lidwinkelstraffung) durchzuführen.

Fettkörper Unterlid

Muskelstraffung Unterlid

Muskelaufhängeplastik

Zur Straffung des Lidrandes kann eine zusätzliche Lidwinkelstraffung -Kanthopexie- durchgeführt werden

Unterlid Hautstraffung

Unterlidkantenanhebung, Straffung-Kanthopexie

Die Operation wird in örtlicher Betäubung oder in Vollnarkose durchgeführt.  
Dauer des Eingriffs ca. 50 Minuten pro Seite.

#### Postoperativ zu beachten:

- Kopfverband für 1 Tag
- Danach feucht warme Kompressen für 7 Tage (zu Hause durchführbar)
- Fädenentfernung nach 3 Tagen
- Gesellschaftsfähig nach 14 Tagen